



MEDISEPT
Prawdziwa dezynfekcja

Procedura postępowania z otoczeniem pacjenta z podejrzeniem / zakażeniem **COVID-19**



Europejskie Stowarzyszenie
Czyste Leczenie

LP	POSTĘPOWANIE	ZALECANE PRODUKTY (LUB RÓWNOWAŻNE)
1.	<p>W trakcie pobytu oraz po opuszczeniu pomieszczenia przez pacjenta nie wchodzić do pomieszczenia bez ŚOI. Obowiązują zasady mycia i dezynfekcji jak w przypadku pomieszczeń, w których przebywa pacjent poddany izolacji drogą powietrzno-kropelkową.</p> <p>W przypadku zanieczyszczenia powierzchni materiałem biologicznym wdrożyć procedurę postępowania z powierzchnią zanieczyszczoną biologicznie - obowiązuje dezynfekcja preparatem o pełnym spektrum działania wirusobójczego</p>	<p>Produkty alkoholowe o zawartości $\geq 60\%$ alkoholu, oraz bezalkoholowe o potwierdzonej skuteczności co najmniej na wirusy osłonkowe.</p> <p>UWAGA! preparatów alkoholowych nie stosować do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych biologicznie</p>
2.	<p>Zestaw do sprzątania i dezynfekcji powierzchni:</p> <ul style="list-style-type: none">• mopy (NAJLEPIEJ JEDNORAZOWE LUB PREPAROWANE – unikamy wówczas problemu z usuwaniem użytego roztworu dezynfekcyjnego)• ściereczki (najlepiej jednorazowego użycia lub preparowane)• roztwór preparatu dezynfekcyjnego (do dezynfekcji powierzchni lub preparowania mopów i ściereczek)	<ul style="list-style-type: none">• 0,5% Quatrodes Extra• 0,5% Quatrodes Forte• 0,25% Quatrodes Strong, przy widocznych zanieczyszczeniach biologicznych stosować r-r 1,5%• Velox Spray alk., nie rozpylać• Velox Top AF alk., nie rozpylać• Velox Foam Extra bezalk. piana• Velox Wipes chusteczki alk.• Velox Wipes NA chusteczki bezalk.
3.	<p>Sprzątać metodą jednokrotnego kontaktu:</p> <ul style="list-style-type: none">• wszystkie pomieszczenia, w których przebywał pacjent / powierzchnie z którymi pacjent miał kontakt / dezynfekować metodą zmywania / przecierania, nie stosować rozprysku – dokładnie zwilżyć powierzchnie, przedmioty, które można zamoczyć dezynfekować przez zanurzenie, dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni potencjalnie najbardziej czystych do najbardziej brudnych• wszystkie małe powierzchnie, z którymi pacjent miał kontakt dezynfekować metodą przetarcia - trudno dostępne powierzchnie pokryć preparatem dezynfekcyjnym przez naniesienie roztworu w miejsce trudno dostępne. Dopuszcza się stosowanie piany - dokładnie pokryć powierzchnie / przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia, pamiętać o włącznikach światła, klamkach, uchwytach łóżka• po użyciu mopy, ściereczki wielorazowe traktować jak bieliznę skażoną, ściereczki, mopy jednorazowe traktować jak odpad medyczny zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania z odpadami medycznymi• po zakończeniu dezynfekcji zdezynfekować zewnętrzne części wózka (części dotykowe, kółka)	<ul style="list-style-type: none">• 0,5% Quatrodes Extra• 0,5% Quatrodes Forte• 0,25% Quatrodes Strong, przy widocznych zanieczyszczeniach biologicznych stosować r-r 1,5%• Velox Spray alk., nie rozpylać• Velox Wipes alk., nie rozpylać



MEDISEPT
Prawdziwa dezynfekcja

Procedura postępowania z otoczeniem pacjenta z podejrzeniem / zakażeniem **COVID-19**



Europejskie Stowarzyszenie
Czyste Leczenie

LP	ZASTOSOWANIE	Zalecane procedury (lub równoważne)
	<ul style="list-style-type: none">po wykonaniu wszystkich czynności porządkowych szczelnie zamknąć worek:<ul style="list-style-type: none">z odpadami medycznymi – umieścić go w pojemniku, stanowiącym opakowanie zewnętrzne, wyłożonym dodatkowo czerwonym workiemostrożnie zdjąć odzież ochronną, umieścić ją w pojemniku na odpady medyczne, zamknąć drugi worek, który nie jest skażony, zamknąć pokrywę, zdezynfekować ręcepojemnik z odpadami medycznymi - transport wewnętrzny / wyznaczona osoba wyposażona w ŚOI, przewozi do magazynu odpadów medycznychpo zakończeniu procedur sprzątnięcia i dezynfekcji pomieszczenia otworzyć okna, pomieszczenie wywietrzyć, jeżeli istnieje taka możliwość zastosować dodatkowo metodę dezynfekcji przez zamgławianie, ozonowanie lub też przeprowadzić naświetlanie lampą UVwózek użyty do sprzątnięcia przewieźć do myjni wózków, założyć ŚOI, wszystkie pojemniki opróżnić, starannie zdezynfekować wszystkie akcesoria użyte podczas procedury (obowiązuje procedura postępowania ze sprzętem do sprzątnięcia po użyciu), pomieszczenie myjni wózków poddać dezynfekcjijeżeli istnieje potrzeba dezynfekcji poczekalni, korytarza – przygotować nowy zestaw do sprzątnięcia i proces przeprowadzić w sposób analogiczny jak wyżej	<p>Velodes Soft dezynfekcja rąk Velodes Silk dezynfekcja rąk Velodes Gel dezynfekcja rąk</p> <p>Velox Spray alk., nie rozpylać 0,5% Quatroles Extra 0,5% Quatroles Forte 0,25% Quatroles Strong, przy widocznych zanieczyszczeniach biologicznych stosować r-r 1,5%</p>
4.	<p>Zalecenia dla personelu transportującego odpady wysoce zakaźne i bieliznę skażoną:</p> <ul style="list-style-type: none">do transportu odpadów medycznych i bielizny skażonej zakładać ŚOIzachować szczególną ostrożność przy transporcie aby nie doszło do otwarcia pojemników. Nie rzucać pojemnikami. Jeśli pojemnik jest ciężki – wykonywać czynności transportowe w dwie osobypo wykonaniu transportu przeprowadzić dezynfekcję wózków transportowych, wózki powinny być zdezynfekowane płynem myjąco-dezynfekcyjnym, a w przypadku np. otwarcia worka - postępowanie jak w przypadku dezynfekcji powierzchni skażonej biologicznejzdjąć odzież ochronną zgodnie z procedurą, zdezynfekować ręcepo zabraniu z magazynów odpadów i bielizny, wózki oraz powierzchnie magazynów należy poddać dezynfekcji	<p>0,5% Quatroles Extra 0,5% Quatroles Forte 0,25% Quatroles Strong, przy widocznych zanieczyszczeniach biologicznych stosować r-r 1,5%</p> <p>Velodes Soft dezynfekcja rąk Velodes Silk dezynfekcja rąk Velodes Gel dezynfekcja rąk</p>